

Anwendungshinweis

Mäusebefall

Bodendüngung

Stand: Mai 2024



Aufwandmenge | pro ha

1. Applikation

Wasser	200l (bei Direktsaat 300l Wasser verwenden)
AKRA Plus 9	0,25 % (0,5l)
AKRA Sulfur+	1,5 % (3l)
AKRA WD	0,5 % (1l)

Anwendungszeit

- ☼ Kann auch in bestehenden Kulturen eingesetzt werden.
- ☼ Bei Bedarf kann eine zweite Applikation, im Abstand von 10 Tagen, erfolgen.
- ☼ Applikation nicht unter + 10°C Lufttemperatur.

INFO

- ☼ Der pH-Wert des Spritzwassers ist mit Zitronensäure auf 5,5 einzustellen.
- ☼ Die weitere Zugabe von **AKRA** Blattdünger kann den pH-Wert absenken.
- ☼ Restliche Zusätze nach dem Einstellen des pH-Wertes einzeln zumischen.
- ☼ Reihenfolge der beizumengenden Produkte beachten.
- ☼ Die Dosierung der **AKRA** Blattdünger ist an die Wassermenge anzupassen.
- ☼ Max. Geschwindigkeit bei der Überfahrt: 8 km/h

ERFOLGREICH

MIT DEM **AKRA DÜNGESYSTEM**

» Garantiert

Seite: 1/1

www.akra.at